Szolgáltatásaink:

Védőoltások

Kedvenceink védelme érdekében védőoltásokkal szükséges, illetve részben kötelező ellátni őket.

Mikrochip

2013 január elsejétől kötelező egységes azonosító jellel (mikrochip) ellátni kutyáinkat, e nélkül nem olthatóak veszettség ellen.

Európai Uniós Állatútlevél

Állatútlevél kiállítása szükséges a nyugodt külföldi utazásokhoz.

Sürgősségi betegellátás

Ha az állat általános állapota rohamosan romlik, azonnali beavatkozást igényel.

(pl.:baleseti vagy traumás állatok ellátása; hirtelen fellépő, ismétlődő hányás; felfúvódás - gyomorcsavarodás; hirtelen fellépő görcsös állapotok).

Belgyógyászati vizsgálat

Teljes körű betegvizsgálat, szükség esetén további kiegészítő vizsgálatok elvégzése (röntgen, ultrahang, vér- vizeletvizsgálat).

Bőrgyógyászati vizsgálat, allergológia

Szülészeti segítségnyújtás

Fogászati kezelések

Foghúzás, ultrahangos fogkőszedés polírozással, egyéb szájüregi kezelések.

Ultrahangos vizsgálatok

Belgyógyászati diagnosztikához, illetve vemhesség megállapításhoz használunk kiegészítő ultrahangos vizsgálatot.

Röntgen felvételek készítése és értékelése

Kiegészítő labor vizsgálatok

Vér-, vizelet-, bélsárvizsgálatok. Mikroszkópos vizsgálatok.

Dr Bod-Ri
Állatorvosi Ambulancia

4030,
Debrecen,
Monostorpályi út 5.

Elérhetőségek:
+36-70-388 4976
+36-70-327 5355
+36-52-873-449
drbodri@gmail.com
https://www.facebook.com/DrBodRiAmbulancia

Dr. Bod-Ri Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Műtét előtti és utáni tudnivalók

Dr Bodorkós Rita
állatorvos

Dr Szetteli Éva
állatorvos

Műtét előtti teendők, tudnivalók

A bódítással, illetve altatással járó beavatkozások esetén az állat biztonsága érdekében a következőket szükséges betartani:

- A műtéti beavatkozás előtt 12 órás eleség megvonás kötelező. Ez idő alatt csak víz lehet az állat előtt, majd 3 órával a beavatkozás előtt már vizet sem kaphat. Egyedi esetekben az állatorvos másként is dönthet, melyről a tulajdonost előzetesen tájékoztatja.

- Feltétlenül jelezze az alábbiakat kedvencéről:
- ismert krónikus betegsége,
- ismert gyógyszer érzékenysége/allergiája van, rendszeresen kap gyógyszereket.

Az állatok altatása egyedileg elbírált gyógyszerekkel történik, kornak, fajtának, rizikócsoportnak megfelelően, melyről a tulajdonost tájékoztatjuk, írásban beleegyezését adja.

A tervezett műtéti beavatkozást követően szigorúan állatorvosi utasításra szállítható haza az állat, többnyire csak teljes ébredés után.

Műtét utáni teendők, tudnivalók

A műtétet követő néhány órában az állatok fázékonyabbak, ezért szobahőmérsékleten érdemes őket tartani az állatorvossal megbeszélt ideig (egyedileg eltérő lehet). Ahogy télen a nagy hideg, úgy nyáron a nagy meleg erős megterhelést jelent a lábadozó szervezet számára.

Az állat a teljes ébredésig, stabil járás visszatérésig kizárólag olyan helyen legyen, ami ránézve nem balesetveszélyes. Ne legyen ágy, fotel, terasz, lépcső, kertitó stb. közelében.

Inni és ennivalót az állatorvos utasítása szerint kaphat, illetve tökéletesen éber állapotban a félrenyelés elkerülése miatt.
Az altatószerek mellékhatása lehet az aznapi eleség felvétele utáni hányás. Érdemes egyszerre a megszokott eleség felét adni.

A beavatkozások során az állat 24 órás hatástartamú fájdalomcsillapítót kap, ami ébredés után is növeli a komfortérzetét, de bizonyos esetekben akár több napig szükség lehet további tablettás/szirupos fájdalomcsillapító adása.

Ha szükséges kedvencének antibiotikumot adni a műtétet követő napokban, erről a műtétet végző állatorvos külön tájékoztatást ad.

A műtétet követően 1-2 nappal az állat „csendesebb” lehet.

Felmerülő kérdés során az ellátó állatorvos kontrollra várja kedvencével.

A műtét jellegétől függően a külső bőrvarrat felszívódó vagy nem felszívódó fonallal készül. A felszívódó bőrvarrat eltávolítást nem igényel. A nem felszívódó bőrvarratot általában 10 nappal a műtétet követően távolítjuk el.

Egyedi esetben fonalra adott helyi allergiás reakció alakulhat ki. Ebben az esetben feltétlen kontrollra várja kedvencét a műtétet végzett állatorvos, majd a további teendőkről tájékoztatást kap.

Sebvédelem:

A műtéti területet varratszedésig védeni kell a szennyeződéstől, nedvességtől és attól, hogy az állat esetleg megpróbálja eltávolítani a varratot.

Erre a célra felfújható védőgallért, hagyományos védőgallért, kötést, pólót, kutyaruhát lehet alkalmazni a seb helyeződésének és az állat vérmérsékletének függvényében.